

疾病名称	症状	潜伏期	允许返校	允许返校前的证明
体温超过 37.3°C;			48小时不发烧（以上海市教育委员会的其他指示为准）。	否
咳嗽、气短、呼吸困难			没有症状	否
新型冠状病毒感染	发热（腋下测量体温高于 37.3）· 乏力· 肌肉酸痛· 咳嗽· 呼吸急促· 呕吐· 腹泻等	1-14 天	退烧后的 48 小时· 并且核酸快速检测结果阴性。	否
传染性结膜炎	眼睛发痒和发红；分泌物	5-12 天	不再有分泌物，也看不到红肿。	否
呕吐、腹泻（病原体不明）			最后一次呕吐或腹泻后48小时；在咨询了急救人员后，偏头痛、旅行病等情况可以例外。	否
诺瓦克病毒；轮状病毒；沙门氏菌、弯曲杆菌	恶心；呕吐；腹泻，痉挛性腹痛；发热	诺瓦克病毒：1-2天，轮状病毒。1-3天，沙门氏菌。6-72小时，弯曲杆菌。1-10天	最早在最后一次呕吐或腹泻后48小时。对于诺瓦克病毒，在最后一次呕吐或腹泻后72小时。遵守卫生规定	是
EHEC感染	血性腹泻；腹痛；恶心；呕吐	2-10 天	康复和3个阴性粪便样本	是
手足口病(包括 B08.4)	发烧；咽喉肿痛；头痛；咽喉肿痛；皮疹手掌和脚掌	4-7 天	诊断后2周 (卫生当局的要求)	是
甲型和戊型肝炎	恶心，疲劳，胃肠道疾病。症状，瘙痒（发黄），体重下降；关节疼痛	15-50 天	眼睛和皮肤发黄后1周	是
疱疹性咽峡炎B08.5 包括	发烧；上颚/喉部出现水泡或溃疡；食欲不振，喉咙痛，头痛和颈部疼痛。	1-5 天	诊断后2周	是
乙型流感嗜血杆菌(Hib)	高烧、流感类似症状、严重头痛、畏光	2-4 天	使用抗生素和康复后	是
传染性脓疱病（树皮癣）	脓疱；脓包；黄色结痂；瘙痒	2-10 天	使用抗生素后24小时，否则在愈合后。	是

流行性感冒 (流感)	典型的流感症状	1-2 天	康复后	是
百日咳(百日咳)	感冒症状, 声音嘶哑; 发热; 轻度至痉挛性咳嗽, 有粘性粘液。	7-20 天	开始使用抗生素后5天, 3周后无症状。	是
头虱病	头部、颈部、耳后瘙痒	家长关于治疗的证明	使用罗伯特-科赫研究所推荐的制剂 (如Nyda) 进行第1次治疗后。	否, 由父母每天检查, 8天后进行第二次治疗。
疥疮	手腕、手指和脚趾间、肚脐、胸部和腋窝部位的皮肤炎症。	14-42 天	治疗和痊愈后	是
肺炎	发热, 咳嗽有痰 (有痰咳嗽) 或干咳, 发冷, 呼吸急促 (肺炎严重时)。	几小时到几周	确诊后10天	是
麻疹	发烧; 结膜炎; 咳嗽; 口腔粘膜的 "Koplik 斑"; 面部和耳后开始出现鲜红的融合性外伤。	8-14 天	康复后, 最早在皮疹发生后的5天。	是
脑膜炎球菌性脑膜炎	严重的、类似流感的症状: 高烧; 严重的全身不适感, 不断增加的、难以忍受的头痛; 畏光症	2-10 天	康复后, 最早在开始使用抗生素的24小时后, 抗生素预防在接触后10天内是有用的。	是
腮腺炎	发烧; 腮腺肿胀, 在一侧或两侧; 咀嚼时疼痛。	12-25 天	康复后, 最早在腺体肿胀发生后10天。	是
口腔溃疡	发热、剧烈疼痛; 口腔发红; 咽喉炎、淋巴结肿大	2-12 天	康复后	否
费弗尔氏腺热	流感类似症状; 淋巴结肿大; 扁桃体肥厚; 口臭, 脾脏肿大。	7-30 天	康复后	否
癣病	流感类似症状, 脸部出现蝴蝶状的皮疹; 全身出现环状、游走性皮疹。	7-14 天	随着皮疹的出现	否
风疹	脸上开始出现小斑点的外伤, 并扩散到全身; 头痛; 淋巴结肿大; 结膜炎。	14-21 天	康复后, 最早在皮疹发生后1周。	是

猩红热、A型链球菌扁桃体炎	皮疹：上身有小斑点的丘疹，扩散到手掌和脚掌；覆盆子舌；口周苍白；发热；头痛，咽喉痛；吞咽困难；淋巴结肿大；扁桃体发红，有包膜。	1-3 天	开始使用抗生素后24小时，否则约2周康复后。	是
结核病	慢性低热、盗汗、体重减轻、呼吸道疼痛、胸痛	在向医生咨询后6-7周	阴性测试证明	是
水痘	皮肤和粘膜上有水泡和结痂（“星空”）的瘙痒性皮炎，发烧	8-28 天	在水泡愈合后，大约1周后	是
带状疱疹	疼痛和水泡局限在皮层内		在水泡愈合后，大约1周后	是

参照亚琛表（罗伯特-科赫研究所推荐）和上海市疾病预防控制中心的规定。

<http://kks-brand.de/cms/images/stories/wiederzulassungstabelle.pdf>