

对于所有传染病，请对学校校园环境负责并遵守卫生措施，如戴口罩、保持距离和勤洗手。

疾病名称	症状	潜伏期	允许返校	允许返校前的证明
体温超过 37.3°C;			48小时不发烧（以上海市教育委员会的其他指示为准）。	否
咳嗽、气短、呼吸困难			没有症状	否
新型冠状病毒感染	发热（腋下测量体温高于 37.3）· 乏力· 肌肉酸痛· 咳嗽· 呼吸急促· 呕吐· 腹泻等	1-14 天	退烧后的 48 小时· 并且核酸快速检测结果阴性。	否
传染性结膜炎	眼睛发痒和发红；分泌物	5-12 天	不再有分泌物，也看不到红肿。	否
呕吐、腹泻（病原体不明）			至少 48 小时无发热，且不早于最后一次腹泻或呕吐后的 48 小时。否则按照上海市教育委员会的现行指南执行（见主页）。	否
诺瓦克病毒；轮状病毒；沙门氏菌、弯曲杆菌	恶心；呕吐；腹泻· 痉挛性腹痛；发热	诺瓦克病毒： 1-2天， 轮状病毒。 1-3天， 沙门氏菌。 6-72小时， 弯曲杆菌。 1-10 天	最早在最后一次呕吐或腹泻后48小时。对于诺瓦克病毒，在最后一次呕吐或腹泻后72小时。遵守卫生规定	是
EHEC感染	血性腹泻；腹痛；恶心；呕吐	2-10 天	康复和3个阴性粪便样本	是
手足口病(包括 B08.4)	发烧；咽喉肿痛；头痛；咽喉肿痛；皮疹手掌和脚掌	4-7 天	诊断后2周 (卫生当局的要求)	是
甲型和戊型肝炎	恶心，疲劳· 胃肠道疾病· 症状· 瘙痒（发黄）· 体重下降；关节疼痛	15-50 天	眼睛和皮肤发黄后1周	是
疱疹性咽峡炎B08.5 包括	发烧；上颌/喉部出现水泡或溃疡；食欲不振· 喉咙痛· 头痛和颈部疼痛。	1-5 天	诊断后2周	是

乙型流感嗜血杆菌(Hib)	高烧、流感类似症状、严重头痛、畏光	2-4 天	使用抗生素和康复后	是
触染性脓疱病 (树皮癣)	脓疱；脓包；黄色结痂；瘙痒	2-10 天	使用抗生素后24小时·否则在愈合后。	是
流行性感 冒(流感)	典型的流感症状	1-2 天	康复后	是
百日咳(百日咳)	感冒症状，声音嘶哑；发热；轻度至痉挛性咳嗽，有粘性粘液。	7-20 天	开始使用抗生素后5天，3周后无症状。	是
头虱病	头部、颈部、耳后瘙痒	家长关于治疗的证明	使用罗伯特-科赫研究所推荐的制剂(如Nyda)进行第1次治疗后。	否，由父母每天检查·8天后进行第二次治疗。
疥疮	手腕、手指和脚趾间、肚脐、胸部和腋窝部位的皮肤炎症。	14-42 天	治疗和痊愈后	是
肺炎	发热·咳嗽有痰(有痰咳嗽)或干咳·发冷·呼吸急促(肺炎严重时)。	几小时到几周	康复	是
麻疹	发烧；结膜炎；咳嗽；口腔粘膜的 "Koplik 斑"；面部和耳后开始出现鲜红的融合性外伤。	8-14 天	康复后，最早在皮疹发生后的5天。	是
脑膜炎球菌性 脑膜炎	严重的、类似流感的症状：高烧；严重的全身不适感，不断增加的、难以忍受的头痛；畏光症	2-10 天	康复后，最早在开始使用抗生素的24小时后·抗生素预防在接触后10天内是有用的。	是
腮腺炎	发烧；腮腺肿胀·在一侧或两侧；咀嚼时疼痛。	12-25 天	康复后，最早在腺体肿胀发生后10天。	是
口腔溃疡	发热、剧烈疼痛；口腔发红；咽喉炎、淋巴结肿大	2-12 天	康复后	否
费弗尔氏腺热	流感类似症状；淋巴结肿大；扁桃体肥厚；口臭·脾脏肿大。	7-30 天	康复后	否
癣病	流感类似症状，脸部出现蝴蝶状的皮疹；全身出现环状、游走性皮疹。	7-14 天	随着皮疹的出现	否
风疹	脸上开始出现小斑点的外伤·并扩散到全身；头痛；淋巴结肿大；结膜炎。	14-21 天	康复后，最早在皮疹发生后1周。	是

<b>猩红热、A型链球菌扁桃体炎</b>	皮疹：上身有小斑点的丘疹，扩散到手掌和脚掌；覆盆子舌；口周苍白；发热；头痛·咽喉痛；吞咽困难；淋巴结肿大；扁桃体发红·有包膜。	1-3 天	开始使用抗生素后24小时·否则约2周康复后。	是
<b>结核病</b>	慢性低热、盗汗、体重减轻、呼吸道疼痛、胸痛	在向医生咨询后6-7周	阴性测试证明	是
<b>水痘</b>	皮肤和粘膜上有水泡和结痂（"星空"）的瘙痒性皮炎，发烧	8-28 天	在水泡愈合后，大约1周后	是
<b>带状疱疹</b>	疼痛和水泡局限在皮层内		在水泡愈合后，大约1周后	是

参照亚琛表（罗伯特-科赫研究所推荐）和上海市疾病预防控制中心的规定。

<http://kks-brand.de/cms/images/stories/wiederzulassungstabelle.pdf>