

Nehmen Sie bei allen Infektionskrankheiten die Verantwortung für die Gesundheit der Schulgemeinschaft ernst und halten Sie Hygienemaßnahmen ein, wie Maske tragen, Abstand halten und häufiges Händewaschen.				
Erkrankung	Symptome	Inkubationszeit	Wiederzulassung	Attest vor Wiederzulassung
Körpertemperatur über 37,3° C			48h fieberfrei (vorbehaltlich anderer Anweisungen der Shanghai Municipal Education Commission)	Nein
Husten, Atemnot, Atembeschwerden			Ohne Symptome	Nein
COVID-19	Fieber (Körpertemperatur Armbeuge höher als 37,3 °C), Müdigkeit, Körperschmerzen, Husten, Atemnot, Erbrechen, Durchfall	1-14 Tage	Mind. 48h fieberfrei, sowie frühestens 48h nach dem letzten Durchfall oder Erbrechen. Ansonsten gemäß den aktuellen Vorgaben der Shanghai Municipal Education Commission (s. Homepage)	Nein
ansteckende Bindehautentzündung	juckende und gerötete Augen; Sekretbildung	5-12 Tage	Kein Sekret und keine Rötung mehr sichtbar	Nein
Erbrechen, Durchfall (Erreger unbekannt)			48h nach letztem Erbrechen oder Durchfall; nach Rücksprache mit First Aid ggf. Ausnahmeregelung bei Migräne, Reisekrankheit etc.	Nein
Noroviren; Rotaviren; Salmonellen, Campylobacter	Übelkeit; Erbrechen; Durchfall, krampfartige Bauchschmerzen; Fieber	Noroviren: 1-2 Tage, Rotaviren: 1-3 Tage, Salmonellen: 6-72 Std., Campylobacter: 1-10 Tage	Frühestens 48h nach letztem Erbrechen oder Durchfall. Bei Noroviren 72h nach letztem Erbrechen oder Durchfall. Hygienevorschriften beachten	Ja
EHEC-Infektion	blutiger Durchfall; Bauchschmerzen; Übelkeit; Erbrechen	2-10 Tage	Genesung und 3 negative Stuhlproben	Ja
Hand-Fuß-Mund-Krankheit (inkl. B08.4)	Fieber; Halsschmerzen; Kopfschmerzen; Aphten; Hautausschlag Handflächen und Fußsohlen	4-7 Tage	2 Wochen nach Diagnosestellung (Vorgabe der Gesundheitsbehörde)	Ja
Hepatitis A und E	Krankheitsgefühl, Abgeschlagenheit, Gastrointst. Sympt., Juckreiz (Gelbfärbung), Gewichtsverlust; Gelenkschmerzen	15-50 Tage	1 Woche nach Gelbfärbung von Haut und Augen	Ja
Herpangina B08.5 inkl.	Fieber; Blasen oder Wunden am Gaumen/Rachenraum; Appetitlosigkeit, Hals-, Kopf- und Nackenschmerzen	1-5 Tage	2 Wochen nach Diagnosestellung	Ja
Haemophilus influenza B (Hib)	hohes Fieber, grippeähnliche Symptome, starke Kopfschmerzen, Lichtscheu	2-4 Tage	nach Antibiotikagabe und Genesung	Ja
Impetigo contagiosa (Borkenflechte)	Eiterbläschen; Pusteln; gelbe Krusten; Juckreiz	2-10 Tage	24h nach Antibiotikagabe, sonst nach Abheilung	Ja
Influenza (Grippe)	typische Grippesymptome	1-2 Tage	nach Genesung	Ja
Keuchhusten (Pertussis)	Erkältungssymptome, Heiserkeit; Fieber; leichter bis krampfartiger Husten mit zähem Schleim	7-20 Tage	5 Tage nach Beginn Antibiotikagabe, ohne Antibiotikum nach 3 Wochen	Ja

Kopfläuse	Juckreiz am Kopf, nacken, hinter den Ohren	Bescheinigung d. Eltern über Behandlung	nach 1. Behandlung mit vom Robert-Koch-Institut empfohlenen Präparat z.B. Nyda	Nein, tägl. Kontrolle durch Eltern, 2.Behandlung nach 8 Tagen
Krätze (Scabies)	Hautentzündung an Handgelenken, Finger- und Zehenzwischenräumen, Bauchnabel, im Brust- und Achselbereich	14-42 Tage	Nach Therapie und Abheilung	Ja
Lungenentzündung	Fieber, Husten mit Auswurf (produktiver Husten) oder trockener Husten, Schüttelfrost, Atemnot (bei schwerer Lungenentzündung)	wenige Stunden bis mehrere Wochen	Nach Genesung	Ja
Masern	Fieber; Konjunktivitis; Husten; Enanthem der Mundschleimhaut "Koplik-Flecken"; hochrotes konfluierendes Exanthem beginnend im Gesicht und hinter den Ohren	8-14 Tage	nach Genesung, frühestens 5 Tage nach Beginn des Ausschlags	Ja
Meningokokken Meningitis	schwere, grippeähnliche Symptome: hohes Fieber; schweres allgemeines Krankheitsgefühl, zunehmende, unerträgliche Kopfschmerzen; Lichtscheu	2-10 Tage	nach Genesung, frühestens 24h nach Beginn Antibiotikagabe, Antibiotika-Prophylaxe bis 10 Tage nach Kontakt sinnvoll	Ja
Mumps	Fieber; Schwellung der Ohrspeicheldrüse, ein- oder beidseitig; Schmerzen beim Kauen	12-25 Tage	Nach Genesung, frühestens 10 Tage nach Beginn der Drüenschwellung	Ja
Mundfäule	Fieber, starke Schmerzen; Rötung im Mund; Aphten, Lymphknotenschwellung	2-12 Tage	nach Genesung	Nein
Pfeiffersches Drüsenfieber	grippeähnliche Beschwerden; Lymphknotenschwellung; Mandeln dick belegt; fauliger Mundgeruch, Milzschwellung	7-30 Tage	nach Genesung	Nein
Ringelröteln	grippeähnliche Symptome, Schmetterlinksförmiger Ausschlag im Gesicht; ringelförmiger, wandernder Ausschlag am ganzen Körper	7-14 Tage	Mit Beginn des Hautausschlags	Nein
Röteln	kleinfleckiges Exanthem beginnend im Gesicht, breitet sich über den ganzen Körper aus; Kopfschmerzen; Lymphknotenschwellung; Konjunktivitis	14-21 Tage	nach Genesung, frühestens 1 Woche nach Beginn des Hautausschlags	Ja
Scharlach, Streptokokken A-Mandelentzündung	Exanthem: kleinfleckige Papeln am Oberkörper, breitet sich zu Handinnenflächen und Füßen aus; Himbeerzunge; periorale Blässe; Fieber; Kopf-, Halsschmerzen; Schluck-beschwerden; Lymphknoten-schwellung; gerötete, belegte Mandeln	1-3 Tage	24h nach Beginn Antibiotikagabe, sonst nach Genesung ca. 2 Wo	Ja
Tuberkulose	Chron. leichtes Fieber, Nachtschweiß, Gewichtsverlust, Atem-, Brustschmerzen	6-7 Wochen nach ärztl. Rücksprache	Nachweis über negative Testung	Ja

Windpocken	juckendem Exanthem mit Bläschen und Krusten ("Sternenhimmel") an Haut und Schleimhäuten, Fieber	8-28 Tage	Nach Abheilung der Bläschen, ca. 1 Woche	Ja
Gürtelrose	auf Dermatom beschränkte Schmerzen und Bläschen		Nach Abheilung der Bläschen, ca. 1 Woche	Ja

Basis Aachener Tabelle (Empfehlung Robert-Koch-Institut) und Regelungen des Shanghai Municipal Center for Disease Control & Prevention

<http://kks-brand.de/cms/images/stories/wiederzulassungstabelle.pdf>